

SZCZEPIENIA

Wybierając się na wizytę w celu zaszczepienia dziecka, proszę przygotować sobie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy dziecko jest chore?
- Czy dziecko było leczone lub badane w szpitalu?
- Czy dziecko jest uczulone na leki, pokarmy lub szczepionki?
- Czy u dziecka wystąpiła już kiedyś poważna reakcja po podaniu szczepionki?
- Czy lekarz stwierdził u dziecka zaburzenia odporności lub podejrzewał ich występowanie?
- Czy u dziecka występowały drgawki lub inne objawy ze strony układu nerwowego (np. zaburzenia świadomości, utrata przytomności, niedowład lub paraliż, upośledzenie umysłowe)?
- Czy dziecko w ciągu minionych 3 miesięcy otrzymywało leki steroidowe (w zastrzykach lub doustnie lub leki przeciwnowotworowe albo zostało poddane radioterapii)?
- Czy w ciągu minionego roku dziecko otrzymało krew, preparaty krwi lub immunoglobuliny?
- Czy dziecko otrzymało jakieś szczepionki w ciągu ostatnich 4 tygodni?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „tak”- poinformuj o tym lekarza kwalifikującego dziecko do szczepienia.

Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP)

Większość ma łagodny przebieg i ustępuje w ciągu kilku dni. Zazwyczaj nie wymagają one interwencji lekarza i szczególnego leczenia. NOP mogą wystąpić po podaniu każdej szczepionki, a do najczęściej stwierdzanych należą: gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, zaczerwienienie, przemijający ból).

Na poważny NOP wskazują następujące objawy:

- omdlenie lub zaburzenia przytomności, bąble pokrzywkowe lub uogólniony rumień skóry, kłopoty z oddychaniem (świsty w klatce piersiowej, świst podczas wdechu) - pojawiają się w ciągu 30 minut po szczepieniu (zatem jeszcze w gabinecie lekarza) i świadczą o ciężkiej, natychmiastowej reakcji uczuleniowej
- wysoka gorączka ($>40,5^{\circ}\text{C}$) w ciągu 2 dni po szczepieniu
- trudny do uspokojenia płacz (krzyk) trwający co najmniej 3 godziny w ciągu 2 dni po szczepieniu
- znacznie zmniejszone napięcie mięśni (dziecko staje się wiotkie) oraz utrudniony kontakt z dzieckiem lub błądźliwość skóry w ciągu 2 dni po szczepieniu
- drgawki w ciągu 2 dni po szczepieniu
- zaburzenia przytomności lub wyraźna, niepokojąca zmiana zachowania dziecka (apatia, brak kontaktu) w ciągu 7 dni po szczepieniu
- krew w stolcu i(lub) wymioty zawierające żółć w ciągu miesiąca (a zwłaszcza w ciągu 7 dni) po podaniu szczepionki doustnej.

Jeżeli po szczepieniu zauważysz u dziecka typowe NOP, koniecznie powiedz o tym lekarzowi. Łagodne reakcje poszczepienne możesz zgłosić podczas kolejnej wizyty, natomiast o poważniejszych objawach poinformuj go natychmiast!

Źródło: Medycyna Praktyczna: Pierwsze 2 lata życia-przewodnik dla rodziców.